

定期予防接種一覧（成人を除く）

保護者は、下記の予防接種を受けさせるよう努める必要があります。

| 接種 | 対象年齢 | 接種回数 | 内容等 |
|------------------------------|--|----------------|---|
| B型肝炎 | 生後2か月から 1歳に至るまで | 3回 | ・1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回 1回目の接種から139日以上の間隔をおいて 1回接種します |
| ヒブ | 生後2か月から 60か月に至るまで | 1～4回 | ・開始時期により、接種回数が異なります ・初回接種開始は生後2か月から7か月に至るま でに行います ・追加接種は初回接種終了後、7か月から13か 月までの間隔をおきます |
| 小児肺炎球菌 | 生後2か月から 60か月に至るまで | 1～4回 | ・開始時期により、接種回数が異なります ・初回接種開始は生後2か月から7か月に至るま でに行います ・追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔を おいて生後12か月以降に接種します |
| 四種混合 (百日せき 破傷風 ポリオ) | 生後3か月から 90か月に至るまで | 4回 | ・初回接種は20日から56日までの間隔をおい て3回受けましょう ・追加接種は3回目の接種から1年経過後に 接種しましょう |
| BCG | 生後5か月から 12か月に至るまで | 1回 | ・腕の上部に細い針が入った管を2か所に押し付 けて接種します。液が自然に乾くまで、お待ち いただきます。 |
| 麻疹風疹 | 1期:生後12か月～24か月未満 2期:小学校就学の始期に達する 日の1年前の日から就学始 期に達する日の前日まで | 1期:1回 2期:1回 | ・1期は1歳を過ぎたらできるだけ早めに受けま しょう ・2期は就学前までに接種しましょう |
| 水痘 | 生後12か月から 36か月に至るまで | 2回 | ・初回接種（1回目）から3か月以上の間隔をお いて受けましょう （標準的には6か月～12か月までの間隔） |
| 日本脳炎 | 1期:3歳から7歳半未満 2期:9歳以上13歳未満 | 1期:3回 2期:1回 | ・日本脳炎は各市町村によって対象年齢が異な り、生年月日によって接種開始年齢や接種回 数が異なります ・対象の方には個別にお手紙を送らせて頂いて います。詳細については、お手元の文書をご 覧頂くか子育て世代包括支援センターへご連 絡下さい |
| | H19.4.2～H21.10.1生まれの方 1期2期:9歳以上13歳未満 | 4回 | |
| | H9.4.2～H19.4.1生まれの方 1期2期:今年度18歳になる方 から20歳未満の方まで | 4回 | |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 小学6年生の1年間 | 1回 | |
| ヒトパピロー マウイルス感 染症 | 小学6年生から 高校1年生までの5年間 | 3回 | ・ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種は、 現在、積極的に接種をおすすめすることを一時 的にやめています。ワクチンの「意義・効果」 と「接種後に起こりうる症状」について確認 し、接種を検討しましょう |

問い合わせ先:浦臼町保健センター内

子育て世代包括支援センター(子育て支援係) 69-2100